

ორსულთა და მელოგინეთა ჰემოროიდული კრიზების მკურნალობა კამელინ მ 3 -ით და კამელინ მ 4 -ით (მაღამო და სანთლები)

ჰემოროიდული კრიზების ეტიოლოგია ორსულებსა და მელოგინეებში

.ყაბზობა

. სისხლძარღვთა პათოლოგიებისადმი განწყობა

. მცირე მენჯის ღრუს სისხლსავსეობა და ვენურუ სტაზი

დაავადების მიმდინარეობა

მწვავე :

. მწვავე ტკივილი გამოწვეული ჰემოროიდული კვანძის თრომბოზით

. შეშუპება

. გამკვრივება

. იშვიათად გარეგანი კვანძის იზოლირებული თრომბოზი

ქრონიკული:

.განმეორებადი სისხლდენები

. ჰემოროიდული კვანძის გამოვარდნა

კლასიფიკაცია კვანძების მდებარეობის მიხედვით

. გარეგანი-განლაგებულია უშუალოდ ანუსის კანქვეშ და წარმოადგენს ქვედა ვენურ წნულებს.

. შინაგანი-განლაგებულია სწორი ნაწლავის ლორწოვანის ქვეშ და წარმოადგენს ზემო ვენურ წნულებს.

სიმპტომები:

- . ანალური ქავილი
- . დისკომფორტი
- . ტკივილი
- . ლორწოს გამოყოფა
- . სისხლდენა

მკურნალობის მეთოდები:

- მედიკამენტოზული
- ოპერაციული

კამელინ მ 3 (მალამო) და კამელინ მ 4 (სანთლები)

კვლევის მიზანი: პრეპარატ კამელინის ეფექტურობის და უვნებლობლობის შესწავლა ჰემოროიდული კრიზით გართულებულ ორსულებსა და მელოგინეებში

მასალა

1 ჯგუფი-უსიმპტომო, უტარდებოდათ პროფილაქტიკური ღონისძიებები: დიეტა, ფიზიკური აქტიურობა, უკანა ტანის ტუალეტი წყლით და კამელინის მალამო ძილის წინ თხელ ფენად ერთჯერ დღეში

2 ჯგუფი-პაციენტები სისხლდენით, ანალური ქავილით და მტკივნეული დეფეკაციით-უტარდებოდათ მკურნალობა კამელინის მალამოს და სანთლების გამოყენებით

3 ჯგუფი- ჩაუტარდათ ქირურგიული მკურნალობა, კამელინ მ 4 -ით წინასაოპერაციო მომზადების შემდეგ.

კამელინ მ 4 -ის შემადგენლობა და თვისებები

. კამელინ მ 4 წარმოადგენს კომბინირებულ პრეპარატს, რომლის შემადგენლობაშიც შედის 21 აქტიური კომპონენტი, ბუნებრივი პოლიფენოლის შენაერთი და ბიოორგანული შენაერთები

. კამელინ მ 4 -ს გააჩნია ანტიბაქტერიული თვისება და ანტიალერგიული მოქმედება. ამცირებს ქავილს, წვის შეგრძნებას, ხოლო ანთების საწინააღმდეგო მოქმედება ზელს უწობს ქავილის რეგენერაციას.

დოზირება

. კამელინ მ 3- მალამო იხმარება გარეგანი ჰემოროიდების შემთხვევაში, თხელ ფენად დაზიანებულ უბანზე დღეში 2-4 ჯერ. ტკივილის მოხსნის შემდეგ , დღეში- 1 ჯერ 7 დღე

. კამელინ მ 4 -სანთლები-იხმარება შინაგანი ჰემოროიდული დაავადებების დროს, დღეში 2 ჯერ 5-7 დღის განმავლობაში. ტკივილის მოხსნის შემდეგ, დღეში -1 ჯერ 7 დღე

მკურნალობის შედეგების შეფასება

კამელინით მკურნალობა შეფასდა როგორც საუკეთესო 100 % შემთხვევაში. მკურნალობის დასრულების შემდეგ მელოგინები თავს ჯანმრთელად თვლიდნენ

დასკვნები:

კამელინი გამოიყენება, როგორც მალამოს, ასევე რექტალური სანთლების სახით, გვევლინება ჰემოროიდული კრიზის მკურნალობის ეფექტურ საშუალებად ორსულებსა და მელოგინებში

. პრეპარატის მოქმედების სისწრაფე და ამტანობა საშუალებას გვაძლევს
გავუწიოთ რეკომენდაცია მის ფართო გამოყენებას სამედიცინო და
პროქტოლოგიურ პრაქტიკაში

დავით ლანდია- მედიკოსი-გინეკოლოგი, საპატრიარქოს, წმინდა ანას და
იოაკიმეს სამშობიარო სახლის, ორსულთა პათოლოგიის გამგე