

„კამელინის“
გამოყენება
სტომატოლოგიის
პრაქტიკაში



პერიოდონტიტით დაავადებულ პაციენტთა ვიზიტების რაოდენობის კონტროლი

| ქრონიკული პერიოდონტიტის ფორმები | საკონტროლო ჯგუფი | | დაკვირვების ჯგუფი | |
|---------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | კბილების რაოდენობა | ვიზიტების რაოდენობა | კბილების რაოდენობა | ვიზიტების რაოდენობა |
| მარტივი ქრონიკული | 4 | 1.75 ± 0.55 | 5 | 1.0 ± 0,05 |
| მაგრანულირებელი | 6 | 2.33 ± 0.31 | 6 | 1.33 ± 0,47 |
| გრანულომური | 5 | 2.0 ± 0.31 | 4 | 1.25 ± 0.25 |
| ქრ.გამწვავებული | 3 | 3.0 ± 0,58 | 6 | 1.5 ± 0.20 |

საკვლევი და საკონტროლო ჯგუფის პაციენტები პირის

ღრუს ლორწოვანის სხვადასხვა დაავადებებით

| | საკვლევი ჯგუფი 15 პაციენტი | საკონტრ. ჯგუფი 10 პაციენტი |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| ვირუსული (ჰერპესული) სტომატიტი | 4 | 2 |
| ქრ. რეციდიული აფთური სტომატიტით | 2 | 3 |
| წყლულოვანი გინგივიტით | 3 | 1 |
| წყლულოვანი სტომატიტი | 2 | 1 |
| კატარული გინგივიტი | 4 | 3 |

მკურნალობის შედეგების (საშუალო მაჩვენებლების)

შედარება საკონტროლო და საკვლევი ჯგუფებში

| შედეგები ჯგუფები | ტკივილის შემცირება | ეპითელიზ. დასაწყისი | სრული რეგენერაცია |
|---------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| საკვლევი ჯგ. | 2,3 დღე | 2,7 დღე | 5,4 დღე |
| საკონტროლო ჯგ. | მე 3 დღიდან | 3,9 დღე | 6,6 დღე |