



კამელონი



გზა სიცოცხლისაკენ



კამელინი

პრეპარატ “კამელინის” შემქმნელი
ბენედიქტე (მაგული) მაღლაკელიძე
(1907-1974),




ყველაფერი ერთი შეხედვით ბანალური
ისტორიით დაიწყო

გვიან ღამით ცნობილი ქირურგთა ბატონ
ბენედიქტე (მაგული) მაღლაკელიძესთან
დაჭრილი მამაკაცი მოიყვანეს, იგი
სისხლიდან იცლებოდა და სასწრაფოდ
საავადმყოფოში გადაყვანას და ოპერაციას
საჭიროებდა. დრო კი არ ითმენდა, იცოდა
რა თაფლის თვისებები ბატონმა მაგულიმ
ჭრილობა თაფლით დაამუშავა, პაციენტი
სიკვდილს გადაურჩა და მცირე დროში
სრულიად გამოჯანმრთელდა. ამ
შემთხვევის შემდეგ ცნობილ ქირურგს
უჩნდება დიდი ინტერესი თაფლის
სამკურნალოწამლო საშუალებად
გამოყენებისა.



კამელინი



კონსტანტინე ერისთავი
(1889-1975)

- ქართველი ქირურგი და საზოგადო
- მოღვაწე. მედიცინის მეცნიერებათა
- დოქტორი, პროფესორი,
- საქართველოს მეცნიერებათა
- დამსახურებული მოღვაწე,
- მეცნიერებათა აკადემიის
- აკადემიკოსი,
- საქართველოს სახელმწიფო პრემიის
- ლაურეატი.



კამელინი

პრეპარატ "კამელინზე" მომუშავე სამეცნიერო
ექიმ-მკვლევართა ჯგუფი





კამელინი

100% ნატურალური, ეკოლოდიურად სუფთა პროდუქტი

მაღალეფექტური

არატოქსიური

არ იწვევს ალერგიას

გამოირჩევა ორგანიზმში შეყვანის გზების მრავალფეროვნებით
ინექციები, პერორალური, გარეგანი, ინსტილაციური,
იმპრეგნაციული,
რექტალური, ვაგინალური

კამელინი - M1, საინექციო ხსნარი



მიღების წესი: ინექციები 2,0 მლ კეთდება დღეში ორჯერ ინტრაუსკულარულად, დილით და საღამოს. კამელინი-M1 შეგვყავს ღრმად დუნდუო კუნთში ნელი ტემპით, წყვეტილად, 20-25 წამიანი ინტერვალებით ცალკეულ ულუფებს შორის. მკურნალობის კურსს ოცი დღე. კურსებს შორის შესვენება რვა დღე. მკურნალობის ხანგრძლივობა 2 -დან 5 თვემდე. საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებელია შემანარუნებელი მკურნალობის გახანგრძლივება.

-რევმატიული ანთებითი დაავადებების -
ოსტეოქონდროზის მათ შორის
გართულებული ფორმების (რეაქტიული
სინოვიტი, ბეიკერის ცისტა, ბურსიტი,
ტენდოვაგინიტი) და ხერხემლის
ოსტეოქონდროზის სამკურნალოდ
გამოიყენება ფიზიოთერაპიული მეთოდი,
კერძოდ ელექტროფორეზი

- ფარმაკოლოგიური ჯგუფი:
იმუნომოდულატორი, ანტიოქსიდანტი
- ფარმაკოლოგიური თვისებები: "კამელინი - M1"
-ს გააჩნია -ს გააჩნია
იმუნომოდულატორული აქტივობა. იგი
აძლიერებს ჰუმორულ და უჯრედოვან
იმუნიტეტს. „კამელინი - M2“-ის ორგანიზმში
შეყვანის შედეგად ხდება $iL-1$, $iL-6$ და $iL-12$
ციტოკინინების გამონთავისუფლება. „
კამელინი M2“ იღებს მონაწილეობას
უჯრედოვანი იმუნიტეტის განვითარებაში და
T- ლიმფოციტურ რეაქციებში, მათ შორის
პერიფერიული ლიმფოციტების მიტოგენების
გაძლიერებაში, T - ჰელპერებისა და T -
ციტოტოქსიური უჯრედების თანაფარდობის
გაზრდაში, მაკროფაგების მიერ
მიკროორგანიზმების და სიმსივნური
უჯრედების საწინააღმდეგო მოქმედების
გაძლიერებაში და Tc - უჯრედების
შემცირებაში. კამელინი ეფექტურია, როგორც
ანტივირუსული, ანტიბაქტერიული,
ანტიოქსიდანტური საშუალება. ახდენს
ანტიპროლიფერაციულ, ანთების
საწინააღმდეგო, ტკივილგამაყუჩებელ ეფექტს,
შემაკავებლად მოქმედებს სიმსივნურ
ზრდაზე. „კამელინი - M2“ აქტიურად
მონაწილეობს ქსოვილების შეხორცებასა და
რეპარაციაში, ხელს უწყობს კოლაგენის
ჩალაგებას დაზიანების ადგილას.

კამელიზი - MI, საინფექციო ხსნარი, ჩვენებები



1. ვირუსული ინფექციები;
2. ბაქტერიული ინფექციები;
3. სოკოვანი ინფექციები;
4. პოლინეიროპათიები;
- 9 პოსოპერაციული პერიოდი
10. ტრავმები



ვირუსული ზედა რესპირატორულ დაავადება



გრიპი



ბაქტერიები:


1. ქლამიდიები
2. რიკეტსიები
3. მიკოპლაზმები



ფრჩხილის სოკო

იმპეტიგო – (კანისა და ვენ. დაავ.)
სტრეპტოკოკებით
და სტაფილოკოკებით
გამოწვეული კანის მწვავე ანთებითი

კამელინი-1, ჩვენებები, გაგრძელება
უროლოგიური და სიმსივნური დაავადებები



ბაქტერიული ურეთრიტი

ქრონიკული
ბაქტერიული პროსტატიტი

კამელინი-1, ჩვენები, გაგრძელება
ოსტეოართრიტები, ხერხემლის ოსტეოხონდროზისა ხსრების-
დეგენერაციულ
დისტროფიული დაავადებები;



კამელინი - M2, კაფსულები



მიღების წესი: კაფსულები მიიღება 3-ჯერ დღეში, საკვების მიღებამდე 30 წუთით ადრე წყალთან ერთად. მკურნალობის კურსი 20 დღე, კურსებს შორის შესვენება 8 დღე. მკურნალობის ხანგრძლივობა 2-5 კურსი (2-5 თვე), საჭიროების შემთხვევაში, შესაძლებელია შემანარჩუნებელი მკურნალობის გახანგრძლივება.



გრიპი



ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი: იმუნომოდულატორი, ანტიოქსიდანტი.

ფარმაკოლოგიური თვისებები: „კამელინი- M2“ -ს გააჩნია იმუნომოდულატორული აქტივობა. იგი აძლიერებს ჰუმორულ და უჯრედოვან იმუნიტეტს. „კამელინი- M2“-ის ორგანიზმში შეყვანის შედეგად ხდება iL-1, iL-6 და iL-12 ციტოკინინების გამონთავისუფლება. „კამელინი M2“ იღებს მონაწილეობას უჯრედოვანი იმუნიტეტის განვითარებაში და T- ლიმფოციტურ რეაქციებში, მათ შორის პერიფერიული ლიმფოციტების მიტოგენების გაძლიერებაში, T – ჰელპერებისა და T –ციტოტოქსიური უჯრედების თანაფარდობის გაზრდაში, მაკროფაგების მიერ მიკროორგანიზმების და სიმსივნური უჯრედების საწინააღმდეგო მოქმედების გაძლიერებაში და Tc – უჯრედების შემცირებაში. კამელინი ეფექტურია, როგორც ანტივირუსული, ანტიბაქტერიული, ანტიოქსიდანტური საშუალება. ახდენს ანტიპროლიფერაციულ, ანთების საწინააღმდეგო, ტკივილგამაყუჩებელ ეფექტს, შემაკავებლად მოქმედებს სიმსივნურ ზრდაზე. „კამელინი- M2“ აქტიურად მონაწილეობს ქსოვილების შეხორცებასა და რეპარაციაში, ხელს უწყობს კოლაგენის ჩალაგებას დაზიანების ადგილას.

კამელინი - M3, მალამო



ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: ანთების
საწინააღმდეგო, ანტისეპტიკური

გამოყენების წესი:

მალამო თხელ ფენად ისმევა
დაზიანებულ უბანზე, შესაძლებელია
დოლბანდის ნახვევის გაკეთება.
ალამოს აპლიკაცია ხდება დღეში 2-
3-ჯერ. მკურნალობის ვადა
განისაზღვრება ჩვენების მიხედვით.



კამელინი-მჰ, მალამო

ჩვენებები: კანის რბილი ქსოვილების ჩირქოვანი და ხანგრძლივად შეუხორცებელი ჭრილობები, ტროპიკული წყლულები, ფურუნკული, პანარიციუმი, ნაწოლები. სახსრების რავმატიული დაავადებები - ოსტეოართრიტები, ხერხემლის ოსტეოქონდროზი



ფურუნკული



დამწვრობა



პანარიციუმი



ნაწოლები



ტროპიკული
წყლული

•რევმატიული ანთებითი დაავადებების - ოსტეოქონდროზის მათ შორის გართულებული ფორმების (რეაქტიული სინოვიტი, ბეიკერის ცისტა, ბურსიტი, ტენდოვაგინიტი) და ხერხემლის ოსტეოქონდროზის სამკურნალოდ გამოიყენება ფიზიოთერაპიული მეთოდი, კერძოდ ულტრაფონოფორეზი

კამელინი - M 4, რექტალურ-ვაგინალური სუპოზიტორიები



ფარმაკოლოგიური მოქმედება:
გააჩნია ანთების საწინააღმდეგო,
ტკივილგამაყუჩებელი ეფექტი,
აჩქარებს რეგენერაციის
პროცესებს, აძლიერებს
ადგილობრივი იმუნური
ბარიერის ფუნქციონირებას.


- მიღების წესები: მოზრდილებში 1
სანთელი დეში 1-2-ჯერ
რექტალურად ან ვაგინალურად
- ბავშვებში 5-დან 12 წლამდე ასაკის
ბავშვებში დიური დოზა შეადგენს
ერთ სანთელს. 12 წლის ასაკის ზევით
ინიშნება ინსტრუქციაში
მითითებული დოზა

კამელინი- M4

ჩვენებები: ვაგინალური ინფექციები, მათ შორის ბაქტერიული, ვირუსული, სოკოვანი გენეზის. საშვილოსნოს ყელის ანთებითი დაავადებების, საშვილოსნოს ყელის ეროზიები, სწორი ნაწლავის ნახეთქები, ჰემორეა, უროლოგიური დაავადებები (ქრონიკული ბაქტერიული პროსტატიტი, ქრნიკული ურეთრიტი)



სწორი ნაწლავის ლორწოვანი
გარსის ანთება



სწორი ნაწლავის
ნახეთქები,



ბუასილი



საშვილოსნოს ყელის
ეროზიები

კამელუნფლუ, სპრეი ადგილობრივი გამოყენების



ფარმაკოლოგიური ჯგუფი:

ანტისეპტიკური, ანთების
საწინააღმდეგო

ფარმაკოლოგიური თვისებები:

“კამელინფლუ“-ს გააჩნია ანთების
საწინააღმდეგო,

ტკივილგამაყუჩებელი ეფექტი,
აგრეთვე ანტიბაქტერიული,
ანტივირუსული და სოკოვანი
ინფექციების საწინააღმდეგო
მოქმედება

მიღების წესი: ფლაკონს იკავებთ
ვერტიკალურ მდგომარეობაში და
აფრქვევთ პირის ღრუში-ყელში.

მოზრდილებში, ყოველი პროცედურის
დროს კეთდება 4 გაფრქვევა, 3-6 ჯერ
დღე ღამეში. საჭიროების
შემთხვევაში შესაძლებელია
მურნალობის გახანგრძლივება

კამელინფლუ გამოყენების ჩვენებები:

პირის ღრუს და ყელის ინფექციები: ფარინგიტი, ლარინგიტი, (კატარალური ანგინა), სტომატიტი, წყლულოვანი გინგივიტი. როგორც დამხმარე საშუალება ქრონიკული ტონზილიტის დროს



ლარინგიტი



სტომატიტი



ფარინგიტი



ტონზილიტი




წყლულოვანი
გინგივიტი

Figure 6 - Acute necrotizing ulcerative gingivitis also affecting the hard palate

კამელინის მიღების უსაფრთხოება

დასახელება	გვერდითი მოვლენები	უკუჩვენებები	ბავშვებში	ორსულობა, ლაქტაცია	ჭარბი დოზირება	სიფრთხილე ავტომაქსანის მართვის ან დანადგარებთან მუშაობისას
კამელინი - M1, ამპულები	თერაპიულ დოზებში არატოქსიურია, არ ახასიათებს გვერდითი მოვლენები. შესაძლებელია ინდივიდუალური ჰიპერმგრძნობელობა სამკურნალო საშუალების კომპონენტების მიმართ	მომატებული მგრძნობელობა შემადგენელი კომპონენტების მიმართ	5 წლამდე ასაკის ბავშვებში ინიშნება მხოლოდ ექიმის რეკომენდაციით. 5-12 ასაკის ბავშვებში დღიური დოზა შეადგენს 1.0 მლ-ს	უკუჩვენებარ არის გამოვლენილი	გადაჭარბებული დოზირების შემთხვევაში უკუჩვენებები არ არის გამოვლენილი	პრეპარატის მიღება სიფრთხილეს არ მოითხოვს
კამელინი - M2, კაფსულები	თერაპიულ დოზებში არატოქსიურია, არ ახასიათებს გვერდითი მოვლენები. შესაძლებელია ინდივიდუალური ჰიპერმგრძნობელობა კომპონენტების მიმართ	მომატებული მგრძნობელობა შემადგენელი კომპონენტების მიმართ	-	უკუჩვენებარ არის გამოვლენილი	გადაჭარბებული დოზირების შემთხვევაში უკუჩვენებები არ არის გამოვლენილი	პრეპარატის მიღება სიფრთხილეს არ მოითხოვს
კამელინი - M3 მალამო	შესაძლებელია ინდივიდუალური ჰიპერმგრძნობელობის გამოვლენა სამკურნალო საშუალების კომპონენტების მიმართ	მომატებული მგრძნობელობა შემადგენელი კომპონენტების მიმართ		უკუჩვენებარ არის გამოვლენილი	გადაჭარბებული დოზირების შემთხვევაში უკუჩვენებები არ არის გამოვლენილი	პრეპარატის მიღება სიფრთხილეს არ მოითხოვს
კამელინი - M4 სუპოზიტორიები	თერაპიულ დოზებში არატოქსიურია, არ ახასიათებს გვერდითი მოვლენები. შესაძლებელია ინდივიდუალური ჰიპერმგრძნობელობა კომპონენტების მიმართ	მომატებული მგრძნობელობა შემადგენელი კომპონენტების მიმართ	5-დან 12 წლამდე ასაკის ბავშვებში დღიური დოზა შეადგენს ერთ სანთელს. 12 წლის ასაკის ზემოთ ინიშნება ინსტრუქციაში მითითებული დოზა	უკუჩვენებარ არის გამოვლენილი	გადაჭარბებული დოზირების შემთხვევაში უკუჩვენებები არ არის გამოვლენილი	პრეპარატის მიღება სიფრთხილეს არ მოითხოვს
კამელინფლუ. სპრეი, ადგილობრივი გამოყენების	თერაპიულ დოზებში არატოქსიურია, არ ახასიათებს გვერდითი მოვლენები. შესაძლებელია ინდივიდუალური ჰიპერმგრძნობელობა სამკურნალო საშუალების	მომატებული მგრძნობელობა პრეპარატის შემადგენელი კომპონენტების მიმართ	-	არ არის შესწავლილი	გადაჭარბებული დოზირების შემთხვევაში უკუჩვენებები არ არის გამოვლენილი	არ ახდენს მოქმედებას
7/28/2014	კომპონენტების მიმართ					17

პროფილაქტიკა რატომ?



- 80-90% რესპირატორული ინფექციები ვირუსული წარმოშობისაა (ვირუსული ინფექციების მკურნალობა ანტიბიოტიკებით ხშირად ნაკლებეფექტურია)
- ბაქტერიული დაავადებები
- ონკოლოგიური დაავადებების პრევენცია

მიზანი



(გართულებები, დაკარგული დრო, მატერიალური დანახარჯები)

არანაირი ავადმყოფობა!



კამელინი

მადლობთ ყურადღებებისთვის