

**ПРИМЕНЕНИЕ КАМЕЛИНА
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ
ПРАКТИКЕ**



Контроль количества визитов пациентов с периодонтитом

Формы хронического периодонтита	Контрольная группа		Основная группа	
	Кол-во зубов	Кол-во визитов	Кол-во зубов	Кол-во визитов
Простой хронический	4	1.75 ± 0.55	5	1.0 ± 0,05
Гранулирующий	6	2.33 ± 0.31	6	1.33 ± 0,47
Гранулемный	5	2.0 ± 0.31	4	1.25 ± 0.25
Хронический обостренный	3	3.0 ± 0,58	6	1.5 ± 0.20

Исследуемые и контрольные группы пациентов с различными заболеваниями слизистой ротовой полости

	Основная группа 15 пациентов	Контрольная группа 10 пациентов
Вирусный стоматит (герпетический)	4	2
Хронический рецидивирующий афтозный стоматит	2	3
Язвенный гингивит	3	1
Язвенный стоматит	2	1
Катаральный гингивит	4	3

СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ В ОСНОВНОЙ И КОНТРОЛЬНОЙ ГРУППАХ (ДНИ - СРЕДНИЕ ПОКАЗАТЕЛИ)

Результаты Группы	<i>Уменьшение болей</i>	<i>Начало эпителизации</i>	<i>Полная регенерация</i>
Основная группа	2,3	2,7	5,4
Контрольная группа	с 3-го дня	3,9	6,6