

„კაველინის“ როგორც საერთაშორისო,
ასევე აღმიარებული აღიარება

ლის გარკვეულ სეგმენტი.

ობიექტურად: რენტგენ-ოლოგიურად სასახსრე ნაპრალების შევიწროება, ოსტეოფიტები; ხერხემლის მალთაშუა სივრცეების შევიწროება, კუჭჭისებრი წანაზარდები. პანორამული ექოსკოპით — სასახსრე ხრტილის არათანაბარი შენება და ზომაში შემცირება, ოსტეოფიტები, სხვადასხვა რაოდენობით ანთებითი სითხე. სისხლში EDS-ის და CRP-ს მომატება. კვლევაში ჩართულ პაციენტებს თრივე პროცედურა უტარდებოდათ, როგორც ბაზისური მკურნალობა, დაზიანებულ სახსრებსა და ხერხემლის დაინტერესებულ სეგმენტზე, ფიზიოთერაპიური მიმღებლები კურატორი მეთავარებით, შეუძინდებობის ჩამოვალისათვის შემუშავდნ 15 დღეს.

Այսպիսով նշուս այսքի-
թև նշանակության բացառության մաս
ուժության արդյունքում



ლი პროსტატიტი, თანდაყოლილი ცისტიტით და ურეთრიტით. სამ გამოსაკვლევ პაციენტს ჰქონდა პროსტატის ადგინომა 1-2 ხარისხის.

ბი, კერძოდ, ბალნეოლოგიურ კურორტში, აკადემიკოს ნიკა სააკაშვილის უშუალო ხელმძღვანელობით. აღნიშნული კვლევების შედეგად „კამელინბა“ შეიძინა ახალი მიმართულებები, როგორც რევმატოლოგიასა და ნევროლოგიაში, ფიზიკურ მედიცინასა და რეაბილიტაციაში, ასევე უროლოგიაში. კომპანია „კამელინის“ მიერ „შერატონ მეტები პალასში“ გამართულ კონფერენციაზე სამეცნიერო-კლინიკურ კვლევებზე დაყრდნობით კადემიკოსება ნიკა სააკაშვილმა მაღალი შეფასება მისცა განსაკუთრებული სახეობის თაფლით ნარმოებულ სამკურნალო-პროფილატიკურ პრეპარატს და აღნიშნა „კამელინის“ გამოყენების მიზანშენონილობა რევმატიული და უროლოგიური დაავადებების დროს.

ბალნეოლოგიური ცენტრის ექიმი რევმატოლოგი, პროფესორი თამარ ჩილიგარიშვილი:

— ჩვენდამი რწმუნებულ დაწესებულებაში ჩატარებულ იქნა პრეპარატ „კამელინ მ3“ მაღამოს ულტრაფონოფორეზის და „კამელინ მ1“ სსნარის ელექტროფორეზის კლინიკური კვლევა რევმატიული დაავადებების, ოსტეოართორიტების, მათ შორის გართულებული ფორმებით (რეაქტიული სინოვიტი, ბეკერის ცისტა, ძურსიტი, ტენდოვაგინიტი) და ხერხემლის ოსტეოქონდროზების დროს, მათ შორის ფესვობრივი სინდრომით. დაკვირვება ჩატარდა 40 პაციენტზე.

პაციენტებს ძირითადად აღნიშნებოდათ ტკივილები სახსრებში, შეშუპება, მოძრაობის შეზღუდვა, დილის შებოჭილობა. ოსტეოქონდროზის დროს ტკივილი ხერხემ-

ჩივილების, ისე ოპიტეტური მონაცემების დადებითი დინამიკით, რაც გამოვლინდა EDS-ის და CRP-ს მაჩვენებლის სარწმუნო დაქვეითებით და ექსპონტური მონაცემების გაუმჯობესებით. რაიმე გართულებას ან გვერდით ეფექტებს ადგილი არ ჰქონია.

ჩატარებულმა კვლევებმა ცხადყო „კამელინის“ სხვადასხვა ფორმის გამოყენების მიზანშენონილობა ზემოთ ხსენებული პათოლოგიების დროს, რამაც საგრძნობლად გააფართოვა მისი გამოყენების არეალი, როგორც კლინიკური მედიცინის დარგებში — რევმატოლოგიასა და ნევროლოგიაში, ისე ფიზიკურ მედიცინასა და რეაბილიტაციაში.

დადებითმა შედეგებმა მოგვცა საშუალება, რევმონდაცია მიგვეცა „კამელინის“ გამოყენებისთვის ოსტეოართორიტების და ოსტეოქონდროზების დროს.

„კამელინით“ მკურნალობის ეფექტურობაზე ნინამდებარებირკვლის დაავადებების დროს გვესაუბრება ბალნეოლოგიური კურორტის ექიმი-უროლოგიზაზა პაინდურიშვილი:

— ჩვენს კლინიკაში ჩატარდა კვლევა, რომლის მიზანი იყო „კამელინით“ მკურნალობის ეფექტურობის შესწავლა უროლოგიური დაავადებების დროს: ქრ. პროსტატიტიტები, ურეტრო-ცისტიტები და პროსტატის ადენომა, კვლევა ჩაუტარდა 30 პაციენტს (31-66 წლამდე მამავაცს), რომელთაც ჰქონდათ ქრონიკული ბაქტერიუ-

„კამელინთან“ დაკავშირებულ საკითხებზე ინფორმაციის მიღება და კონსულტაცია უფასოა, დარეკეთ: 98-57-78; 98-62-25 (ოფისი); 45-33-68; 22-26-68; 75-04-08; 899 33 10 89; 877 73 56 51; 899 23 03 33;

მინდა განსაკუთრებით გამოყორი შემთხვევა:

1. პაციენტი ქ.დ. 49 წლის, დიაგნოზი — ქრონიკული პროსტატიტიტი, პროსტატიტის ადენომა I, II სტად. პროსტატიტის მოცულობა 64,3 ქსოვილის სისქეში-პერიფერიულ ზონებში ისახებოდა შერეული ექოგენების და ექოსტრუქტურის მოცულობით წარმონაქმნები დიამეტრით 22, 21, 18 მმ, ნარჩენი შარდი — 40 მლ. „კამელინით“ მკურნალობის ერთი კურსის შემდეგ მივიღეთ — ზომა 36 გ პროსტატიტის პერიფერიული ნანილი კუროვანი ცვლილებების გარეშე, ლეიკოციტოზი შემცირდა (30-35 დან 10-15 მდე).

2. პაციენტი დ.ვ. 57 წლის, დიაგნოზი — ქრონიკული პროსტატიტიტი, პროსტატიტის ადენომა (2-3 სტადია). პროსტატიტის ზომა 80,4 გ PSA-11,0. „კამელინით“ მონოთერაპიული მკურნალობის ერთი კურსის შემდეგ პროსტატიტის ზომა 49,9 გ PSA-6.

ზემოთქმულიდან გამომდინარე ვასკნით, რომ პრეპარატ „კამელინის მ 1“ და „კამელინის მ 4“ ფორმების გამოყენება მონო და კომპლექსური თერაპიის სახით, ქრონიკული პროსტატიტიტების და ქრონიკული ურეტრიტების დროს მაღალეფებზე გამოიყენება უროლოგიური დაავადებების დროს. მიღებული შედეგებიდან გამომდინარე მიზანშენილად მიგვაჩინა „კამელინის“ გამოყენება უროლოგიური დაავადებების დროს.

მოამზადა მაია ცომაიამ

